

## IEF 电极缓冲液(10×,pH4.0 ~ 6.5)

### 产品简介:

聚丙烯酰胺凝胶电泳(Sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis, SDS-PAGE)其原理在于聚丙烯酰胺凝胶为网状结构, 具有分子筛效应, 聚丙烯酰胺凝胶等电聚焦电泳(isoelectric focusing-PAGE, IEF-PAGE)是利用各种蛋白质 pI 不同, 以聚丙烯酰胺凝胶为电泳支持物, 并在其中加入两性电解质载体, 在电场作用下蛋白质在 pH 梯度凝胶中泳动, 当迁移至其 pI=pH 处不再泳动, 而是浓缩成狭窄的区带。

Leagene IEF 电极缓冲液(10×, pH4.0 ~ 6.5)是用于聚丙烯酰胺凝胶等电聚焦电泳(IEF-PAGE)的电极溶液, 该溶液在电极上不产生易挥发, 正、负电极缓冲液的作用是避免样品及两性电解质载体在负极还原或在正极氧化, 其 pH 值应比形成的 pH 梯度的负极略高, 比正极略低, IEF 电极缓冲液(10×, pH4.0 ~ 6.5)由 IEF 阳极缓冲液和 IEF 阴极缓冲液组成, 一般配套使用, 其梯度范围为 4.0 ~ 6.5。该试剂仅用于科研领域, 不宜用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

名称	编号	PE0220	Storage
试剂(A): IEF 阳极缓冲液(10×, pH4.0 ~ 6.5)		500ml	RT
试剂(B): IEF 阴极缓冲液(10×, pH4.0 ~ 6.5)		500ml	RT
使用说明书		1 份	

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、用去离子水稀释 IEF 阳极缓冲液(10×, pH4.0 ~ 6.5)至 1×使用, 置于正极。
- 2、用去离子水稀释 IEF 阴极缓冲液(10×, pH4.0 ~ 6.5)至 1×使用, 置于负极。

### 注意事项:

- 1、电极缓冲液具有腐蚀性, 请小心操作, 如粘至皮肤等处, 立即流水冲洗。
- 2、配制聚丙烯凝胶的过程中, 如果室温较低, 可以 37°C 放置, 加速凝固。

**有效期:** 12 个月有效。

**相关产品:**

产品编号	产品名称
CA0012	潮霉素 B 溶液(Hygromycin B,50mg/ml)
CA0075	青霉素-链霉素混合溶液(100×双抗)
CC0128	胰蛋白酶-EDTA 溶液(0.25%:0.02%,含酚红)
CM0223	L-谷氨酰胺溶液(0.2mol/L)
DM0007	瑞氏-姬姆萨复合染色液
PE0080	Tris-HCl 缓冲液(1mol/L,pH6.8)
PS0013	RIPA 裂解液(强)
PW0053	Western 抗体洗脱液(碱性)
TC0713	葡萄糖检测试剂盒(GOD-POD 比色法)